

ĀTRS. EFEKTĪVS. IETEICAMS.

CITROclorex 2%


Dezinficējošs līdzeklis uz spirta pamata, kas satur 2% hloreksidīna diglukonātu, higiēniskai roku un ādas dezinfekcijai, iedarbīgs pret baktērijām, tuberkulozi, raugiem un vīrusiem (iesk. HBV, HCV, HIV).

Lietošanai gatavs hlorheksidīna šķīdums etanolā, kas nodrošina gan tūlītēju, un ilgstošu ādas dezinfekciju.

Paredzēts higiēniskai roku un ādas dezinfekcijai (arī bagātai ar tauku dziedzeriem).

Turklāt, tas nodrošina:

- ▲ Plaša spektra antibakteriālu iedarbību ar īsu ekspozīcijas laiku, kas garantē ātru un vienkāršu ādas dezinfekciju pirms operācijas.
- ▲ Plaša iepakojumu izvēle dažādam pielietojumam.
- ▲ Samazināts kairinājuma risks, pateicoties glicerīnam, āda labi panes līdzekli.



CITROclorex 2%

Dezinficējošs līdzeklis uz spirta pamata, kas satur 2% hloreksidīna iglukonātu higiēniskai roku un ādas dezinfekcijai, iedarbīgs pret baktērijām, tuberkulozes mikobaktērijām raugiem un vīrusiem (iesk HBV, HCV, HIV).

Kāpēc CITROclorex 2%?

GARANTĒTA FEKTIVITĀTE

Līdzekļa pamatā ir aktīvās vielas, piemēram, 2% hloreksidīns un 70% etilspirts, kas nodrošina plaša spektra antibakteriālu iedarbību gan pret gram-pozitīvām gan gram negatīvām baktērijām.

Turklāt CITROclorex 2% efektīvi cīnās ar baktērijām, raugiem un vīrusiem (iesk. HBV, HCV un HIV) saskaņā ar Roberta Koha Institūta (RKI) 2004. g. vadlīnijām.

PAGARINĀNA IEDARBĪBA

Papildus tūlītējai antibakteriālai iedarbībai, hloreksidīna diglukonāta iedarbība ilgst līdz pat sešām stundām pēc pielietošanas.¹

TESTĒŠANA UN IETEIKUMI

Vairākas starptautiskās vdlīnijas apstiprina leģitimitāti, izmantojot produktus ar hloreksidīna glikonātu ādas dezinfekcijai. Tabulā ir uzskaitītas publikācijas par šo tēmu.

¹ Novērtēšanas ziņojums, Medikamentu un zāļu uzraudzības birojs (MHRA), 2010. gada jūlijā.

MIKROBIOLOĢISKO TESTU REZULTĀTI

DARBĪBAS SPEKTRS	EKSPOZĪCIJAS LAIKS
EN 1500 Higiēniskā roku dezinfekcija	30 sek.
Ādas dezinfekcija	30 - 60 sek.
Dezinfekcija ādai bagātai, kas bagta ar tauku dziedzeriem	5 min.
EN 13727 Baktericīds	30 sek.
EN 13624 Pret raugiem	30 sek.
EN 14348 Mikobaktericīds (ieskaitot tuberkulozi)	30 sek.
EN 14561 Baktericīds	30 sek.
EN 14562 Pret raugiem	30 sek.
EN 14563 Mikobaktericīds (ieskaitot tuberkulozi)	30 sek.
Aktīvi pasargā pret visiem vīrusiem (ieskaitot HBV, HCV un HIV) saskaņā ar DVV (Vācijas vīrusu slimību apkarošanas asociācija)/ RKI (Roberta Koha Institūts)	30 sek.

VADLĪNIJAS PAR HLORHEKSIDĪNA DIGLUKONĀTU SATUROŠU PRODUKTU LIETOŠANU

VADLĪNIJAS	IZDEVĒJS
Injekcijas dūriena vietas aprūpe: klīniski un ekonomiski ieguvumi, kas rodas lietojot hloreksidīna glikonātu salīdzinājumā ar jodu.	Clinical Infectious Diseases 2003; 37:764–71 2003 Amerikas Infekcijas Slimību Asociācijas (ASV) publikācija
EPIC 2	R.J. Pratt et al., Journal of Hospital Infection (2007) 65S, S1–S64 (Wlk. Bryt.)
EPIC 3	H.P. Loveday et al., Journal of Hospital Infection 86S1 (2014) S1–S70 (Wlk. Bryt.)
Vadlīnijas slimnīcā iegūto infekciju profilaksei	Clinical Infectious Diseases 2011;52(9): e162–e193. Oksfordas Universitātes Preses publikācija Amerikas Infekcijas Slimību Asociācijai (ASV)
Klīniskās vadības apmācības ceļvedis: pacientu un personāla drošība	Veselības ministrija, 2012. g. janvāri (Itālija) www.salute.gov.it/imgs/c_17_pubblicazioni_1688_allegato.pdf
Vadlīnijas slimnīcā iegūto intravaskulāro infekciju profilaksei	Polijas Epidemioloģiskā Medmāsu Asociācija, izdevums VIII 2011
CDC - vadlīnijas slimnīcā iegūto infekciju profilaksei, 2011. g. galvenie noteikumi	Terapeitiskās Higiēnas Asociācija

Ecolab Europe GmbH
Richtstrasse 7
CH-8304 Wallisellen, Zurich
www.ecolab.com

Ecolab SIA
Rītausmas iela 11B, Rīga,
LV - 1058, Latvija,
Tel. +371 670 63 770

ĀTRS. EFEKTĪVS. IETEICAMS.

PIELIETOŠANAS JOMAS

CITROclorex 2% ir ieteicams vispārējai ādas dezinfekcijai pirms invazīvām procedūrām. Tas ir arī ieteicams higiēniskai roku dezinfekcijai.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Higiēniska roku dezinfekcija - sausas rokas berzēt 30 sekundes ar ne mazāk kā 4 ml līdzekļa. Rokas visu dezinfekcijas laiku ir jāmitrina ar līdzekli.

Ādas dezinfekcija:

Ekspozīcijas laiks 30 - 60 sek. Ar tauku dziedzeriem bagātai ādai dezinfekcija 5 min. Līdzeklis paredzēts lietošanai tikai uz veselās roku ādas.

SASTĀVS

100 g līdzekļa satur:
Aktīvās sastāvdaļas: 73,6 g etanols 95%,
2 g D-glikonskābes savienojums ar N,N''-bis(4-hlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekāndiamidīnu (2:1) (hlorheksidīna diglukonāts)
Palīgvielas: glicerīns, attīrīts ūdens līdz 100 g.

Biocīda atļaujas nr.: LV12122013/7020

Tikai profesionālai lietošanai.

INFORMĀCIJA PASŪTĪJUMIEM

IEPAKOJUMS	SKAITS	PRODUKTA KODS
1 l pudele	12 gab.	30 772 50