

Skinsept® color

(45,54g + 1,0g + 27g)/100ml šķīdums ādai

96% Etanols + Benzilspirts + Izopropilspirts

ŠĶĪDUMS ĀDAS DEZINFEKCIJAI



Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šo produktu tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis farmaceits, ārsts, vai medicīnas māsa.

Saglabājiēt šo instrukciju. Jums var rasties vajadzība izlasīt to vēlreiz. Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiēt farmaceutam.

Ja Jūs novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzu izstāstiet to savam ārstam vai farmaceutam.

Ja Jūs nejūtat uzlabojumu vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar savu ārstu.

1. KAS IR SKINSEPT COLOR UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

Šis zāles lieto, lai dezinficētu ādu pirms operācijas, injekcijas, punkcijas, asins paraugu ņemšanas un vakcinācijas.

Skinsept color ir vielu komplekss, kas satur aktīvās vielas, kas nodrošina efektivitāti.

Izmantotās aktīvās sastāvdaļas: izopropanols, etanols un benzilspirts papildina aktivitātes jomu, kas nodrošina antiseptisku iedarbību.

Līdzeklis ir efektīvs pret izplatītām ādas baktērijām, ieskaitot tuberkulozes mikobaktērijas un pret meticilīnu rezistentiem stafilokokiem (**MRSA**), patogēnām sēnītēm un vīrusiem, **B,C** hepatītu HIV, herpēm, adenovīrusu un rotavīrusu.

Līdzeklis ir aizsargāts ar autortiesībām. Līdzekļa sterilitāte saglabājas arī pēc atkārtota mikrobioloģiskā piesārņojuma. (Eiropas Patenta Nr. 0016319)

2. SVARĪGA INFORMĀCIJA PIRMS SKINSEPT COLOR LIETOŠANAS

Nelietot Skinsept color, lai dezinficētu vaļējas brūces ar lielu virsmas laukumu. Nav piemērots gļotādu dezinfekcijai. Nelietojiet ādai ap acīm. Nepielietot jaundzimušajiem. Nepielietot sastāvdaļu nepanesības gadījumā.

Lietojot līdzekli, piemērojiet īpašu piesardzību, līdzeklis ir uzliesmojošs. Neizsmidziniet pie atklātas uguns. Uzliesmošanas temperatūra ir 21°C (atbilstoši DIN 51755). Ievērojiet noteikto ekspozīcijas laiku un drošības noteikumus. Pirms elektrisko ierīču ieslēgšanas, ļaujiet līdzeklim nožūt. Esiet piesardzīgi dezinficējot virsmas, kas ir jutīgas pret alkoholu. Izvairieties no iekļūšanas acīs. Sargāt no siltuma, dzirkstelēm un atklātas uguns. Iepakojumu atveriet uzmanīgi.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Skinsept color un kādām nolūkam to lieto
2. Pirms Skinsept color lietošanas
3. Kā lietot Skinsept color
4. Iespējamās blakusparādības
5. Kā uzglabāt Skinsept color
6. Sīkāka informācija

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Grūtniecība

Līdzeklis nav pētīts uz grūtniecēm. Testi nav veikti arī uz dzīvniekiem. Esiet uzmanīgi, pielietojot līdzekli grūtniecēm.

Zīdīšanas periods

Nav klīnisku datu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana.

Nav datu par to ietekmi.

Svarīga informācija par dažādām sastāvdaļām.

Skinsept color satur azokrāsvielas, kas var izraisīt alerģisku reakciju īpaši jutīgiem pacientiem. Alerģiska reakcija biežāk var rasties cilvēkiem ar alerģiju pret aspirīnu.

3. KĀ LIETOT SKINSEPT COLOR

Līdzeklis jālieto atbilstoši norādītajām lietošanas instrukcijām. Šaubu gadījumā konsultējieties ar ārstu.

Lietošanas norādījumi:

Līdzeklis paredzēts tikai ārīgai lietošanai.

Ādas dezinfekcija pirms operācijām un punkcijām.

Tamponā iesūcinātu, neatšķaidītu līdzekli vienmērīgi uzklājiet uz ādas un uzgaidiet 1 minūti līdz tā nožūst. Hepatīta vīrusa (HBV) briesmu gadījumā pagariniet darbības ilgumu līdz 2 minūtēm, vēlreiz uzklājiet līdzekli uz ādas. Šī procedūra ir jāatkārto.

Ādas dezinfekcijai pirms injekcijām, asins paraugu ņemšanas, vakcinācijas, akupunktūras.

Izvēlēto ādas laukumu apsmidziniet pirms ievietošanas un uzgaidiet 15 sek. Paplašiniet iedarbību pret vīrusiem, pagarinot ekspozīcijas laiku līdz 1 min. HBV bīstamības gadījumā pagariniet ekspozīcijas laiku līdz 2 min. un tad apsmidziniet ādu atkārtoti. Lietojot līdzekli, šaubu gadījumā konsultējieties ar ārstu.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Līdz šim, nav novērotas.

Zīņojiet savam ārstam vai farmaceitam par jebkādam blakusparādībām.

5. SKINSEPT COLOR UZGLABĀŠANA

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt nepieejamā un bērniem neaizsniedzamā vietā.

Nelietot pēc derīguma termiņa beigām.

Zāles nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Vaicājiet farmaceitam, ko darīt ar līdzekli, kas vairs nav nepieciešams.

Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtni vidi.

6. CITA INFORMĀCIJA

100g Skinsept color satur 45,54g etanola 96% piesārņots 1% etilmetilketonu, 1,0g benzilspirta un 27,0g izopropilspirta.

Palīgvielas: ūdeņraža peroksīds, saulrieta dzeltenais (E110), karmīnsarkanais (E124), attīrīts ūdens.

Skinsept color iepakojumā, Skinsept color šķīdums ir sarkani caurspīdīgs.

Līdzeklis ir iepakots 250ml vai 350ml pudelē ar izsmidzinātāju, 1 litra pudelē un 5 litru kannā ar pudeles vāciņu.

Biocīda inventrizācijas nr: 28032007/3311

Pēdējās aktualizācijas datums: 2015/12/13

Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

Piejamie iepakojumi		
Atsevišķi	Vairumā	Kods
Pudele 1 l	12 gab.	3005330
Kanna 5 l	1 gab.	3053250

