



MidoSept Q



Efektīva ādas antiseptika un attaukošana

Bezkrāsains ādas antiseptiskais līdzeklis lietošanai pirms operācijām, injekcijām, vakcinācijas, asins paraugu ņemšanas, akupunktūras.

Lietošanai gatavs

Satur spirtus

Satur četrreizvietotā amonija sāļus

Ātra un daudzpusīga iedarbība



250 ml

500 ml

1000 ml

5000 ml

MIDO PHARM

www.midopharm.com

MidoSept Q



PIELIETOJUMS:

MidoSept Q ir lietošanai gatavs ātras iedarbības ādas antiseptiskais līdzeklis

Paredzēts ādas antiseptikai un attaukošanai pirms operācijām, injekcijām, vakcinācijām, punkcijām, asins paraugu ņemšanas, akupunktūras, biopsijas ņemšanas un kanulācijām un citām līdzīgām darbībām, brūču un šuvju apstrādei, higiēniskai roku dezinfekcijas, vispārējo higiēnas pasākumu uzturēšanai ādas sēnišu infekciju profilaksē, diabētiķiem, cukura līmeņa asinīs mērīšanai un insulīna nodrošināšanai.

- Nelietot lai dezinficētu valējas brūces ar lielu laukumu.
- Nelietot uz ādas zem žņaugu aproces.
- Nav paredzēts lietot ādai ap acim un gļotādas dezinfekcijai.
- Nelietot jaundzimušajiem.
- Ne profesionālai un profesionālai lietošanai.
- Neizmantojiet produktu kā zāles!

Paredzēts lietošanai slimnīcās, poliklīnikās, veselības centros, pansionātos, sociālajos centros, fizioterapijā, tetovēšanas salonos, frizētavās, manikīra un pedikīra salonos kā arī aprūpei mājās apstākļos.

LIETOŠANA:

Ādas dezinfekcija pirms operācijām vai punkcijām:

Izsmidziniet tieši uz dezinficējamās ādas vai piesūciniet sterilu tamponu ar līdzekli un vienmērīgi uzklājiet uz ādas. Smidzināšanas laikā saglabājiet attālumu starp smidzinātāju un ādu pietiekami mazu, lai izvairītos no aerosola izplatīšanās un lai nodrošinātu pietiekošu samitrināšanu. Uzgaidiet 1 minūti līdz nožūst. Hepatīta vīrusa (HVB) apdraudējuma gadījumā pagariniet ekspozīcijas laiku līdz 2 minūtēm, tad atkārtojiet uzklāšanas procedūru.

Ādas dezinfekcija pirms injekcijām, vakcinācijām, asins paraugu ņemšanas un akupunktūras:

Ādas virsmu apsmidziniet un uzgaidiet 15 sekundes. Iedarbību pret vīrusiem pagariniet, palielinot ekspozīcijas laiku līdz 1 minūtei, bet HVB apdraudējuma gadījumā - līdz 2 minūtēm, tad atkārtoti apsmidziniet ādu. Ar tauku dziedzeriem bagātai ādai dezinfekcijas laiks 5 min.

Ādas antiseptika incīzijas folijas un termokautera pielietošanas gadījumā:

MidoSept Q nodrošina īpaši labu saķeres īpašības ar incīzijas foliju. Lai izvairītos no pārmērīgas saķeres un neapdraudētu saķeres efektu, jānogaida pilnīga ādas izžūšana pirms folijas vai termokautera lietošanas.

Higiēniskai roku dezinfekcijai:

Apmēram 3 ml neatšķaidīta MidoSept Q ieberzē rokās apmēram 30 sekundes. Rokām ir jābūt samitrinātām ar dezinfektantu visa kontakta laikā.

IEGUVUMI LIETOJOT:

- Ātra iedarbība [15 sek. pirms injekcijām]
- Ilgstoša iedarbība, līdz 3 stundām
- Plaša spektra antiseptiskā iedarbība
- Laba incīzijas folijas saķere
- Teicama savietojamība ar ādu

MIDO PHARM

IZPLATĪTĀJS:

SIA MEDILINK
Reģ.Nr. LV40003996045
Višķu iela 2 k-1, Rīga,
Latvija, LV-1063
Tel.: +371 67 840 380
Fax: 67 840 377
E-pasts: medilink@medilink.lv
www.medilink.lv

RAŽOTĀJS:

SPODRA SIA
Reģ. Nr. LV40003941352
Lubānas iela 17-1, Rīga,
Latvija, LV-1019
Tel.: +371 29 624 524
E-pasts: rikra@sveiks.lv
www.spodra.com

www.midopharm.com

MidoSept Q



SASTĀVS:

100 g līdzekļa satur:
spirti (etanols, izopropanols) 70 g; Benzalkonija hlorīds 0,025 g; Didecildimetilamonija hlorīds 0,025 g

IEDARBĪBAS LAIKS / PROCEDŪRA

ĀDAS ANTISEPTIKA	
Pirms injekcijām un punktūras	15 sek.
Pirms locītavu, viscerālu dobumu, dobu orgānu punktūras un ķirurģiskajām procedūrām	1 min.
Āda, bagāta ar tauku dziedzeriem, pirms katras procedūras	2 min.
BAKTĒRIJAS	
Baktericīda aktivitāte uz DGHM (P. aeruginosa, S.aureus, E.hirae, E.coli, P. mirabilis)	15 sek.
MRSA/ EHEC	1 min.
MIKOBĀKTĒRIJAS	
Tuberkulocidāls (M. terrae)	30 sek.
SĒNĪTES	
Pretsēnišu iedarbība (C. albicans)	15 sek.
VĪRUSI	
Aploksnes vīrusi Virucīds pret aploksnes vīrusiem (ieskaitot HCV, HIV, HBV)	30 sek.
Bez-aploksnes vīrusi; Rota vīruss	30 sek.

MIKROBIOLOĢISKĀS TESTĒŠANAS REZULTĀTI

TESTĒŠANAS OBJEKTS	IEDARBĪBAS LAIKS
Candida albicans	15 sek.
Escherichia coli (E.coli)	15 sek.
Pseudomonas aeruginosa	15 sek.
Staphylococcus aureus	15 sek.



PIEJAMIE IEPAKOJUMA VEIDI

PRODUKTA VIENĪBAS	IEPAKOJUMS	ARTIKULS
50 ml pudele ar smidzinataju	20 gab.	007595
250 ml pudele ar smidzinataju	12 gab.	007601
500 ml pudele ar smidzinataju	12 gab.	007618
1 L pudele ar korķi	12 gab.	007625
5 L kanna	1 gab.	007632

Biocīda inv. Nr.: LV06012020/83

MIDO PHARM

IZPLATĪTĀJS:

SIA MEDILINK
Reģ.Nr. LV40003996045
Višķu iela 2 k-1, Rīga,
Latvija, LV-1063
Tel.: +371 67 840 380
Fax: 67 840 377
E-pasts: medilink@medilink.lv
www.medilink.lv

RAŽOTĀJS:

SPODRA SIA
Reģ. Nr. LV40003941352
Lubānas iela 17-1, Rīga,
Latvija, LV-1019
Tel.: +371 29 624 524
E-pasts: rikra@sveiks.lv

www.spodra.com

www.midopharm.com