



TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA VIENĀ SOLĪ

Incidin™ OxyFoam NG Incidin™ OxyWipe NG

LIETOŠANAI GATAVS VIRSMU DEZINFEKCIJAS UN TĪRĪŠANAS ŠĶĪDUMS

Incidin™ OxyFoam NG un Incidin OxyWipe NG uzlabotā patentētā sastāva priekšrocības.

Ūdeņraža peroksīda šķīdums kombinācijā ar fenoksietanola sinerģisko iedarbību:

- Efektīvs sastāvs bez smaržvielām un krāsvielām
- Tīrīšana un dezinfekcija vienā solī - redzami tīras virsmas
- Sastāvs, kura pamatā ir bioloģiski noārdāmas sastāvdaļas

Pateicoties savām īpašībām, Incidin OxyFoam NG un Incidin OxyWipe NG ir piemēroti lietošanai uz dažādām virsmām veselības aprūpes iestādēs un ir ideāli piemēroti intensīvās terapijas un citās augsta riska zonās.



*Eiropas patents EP1987121



Ecolab (Šveice) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach Šveice

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™

Incidin™ OxyFoam NG

LIETOŠANAI GATAVS VIRSMU DEZINFEKCIJAS UN TĪRĪŠANAS ŠĶĪDUMS

EFEKTĪVS

- Plašs darbības spektrs un īss iedarbības laiks - apvienojumā ar tīrīšanas veiktspēju

DROŠS

- Lieliska plaša materiālu saderība, tostarp ar jutīgām virsmām, piemēram, ABS, PMMA-Plexiglas.

LIETOTĀJAM DRAUDZĪGS

- Tīrīšana un dezinfekcija vienā soli

ĪPAŠĪBAS

- Stabilas putas labai virsmas saķerei (750 ml)

MIKROBIOLOĢISKĀ EFEKTIVITĀTE BIOCĪDU UN MEDICĪNAS PRODUKTU LIETOŠANA

EFEKTIVITĀTE	EFEKTĪVAIS LAIKS
Virsmu dezinfekcija saskaņā ar VAH procedūru 2015 (augsta slodze)	
Baktericīds, levurocīds	1 min
EN 16615* (baktericīds, levrocīds)	1 min
EN 16615* (fungicīds)	5 minūtes
EN 16615* (tuberkulocīds/mikobaktericīds)	15 minūtes
EN 13727* (baktericīds)	1 min
LV 13624* (levrocīds)	2 min
EN 13624* (fungicīds)	15 minūtes
EN 14348* (tuberkulocīds/mikobaktericīds)	30 minūtes
EN 14476* (ierobežota viruicīda iedarbība)	5 minūtes
EN 14476** (ierobežota viruicīda iedarbība PLUS)	30 minūtes
LV 14476** Adenovīruss	30 minūtes
LV 14476*/** Norovīruss (MNV)	30 minūtes
LV 14476* Poliomavīruss SV 40	5 minūtes
LV 14476* Rotavīruss	5 minūtes
Ierobežota viruicīda iedarbība (ieskaitot HIV, HBV, HCV) saskaņā ar RKI ieteikumu 2022***	30 sek.

* augsta slodze ** zema slodze *** DVV 2015 suspensijas tests

UZMANĪGI LIETOT BIOCĪDUS UN MEDICĪNAS PRODUKTUS.

PIRMS LIETOŠANAS VIENMĒR IZLASIET ETIĶETI UN INFORMĀCIJU PAR PRODUKTU.
TIKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI.

PIEMĒROŠANAS JOMA



Medicīniskās ierīces:

Lietošanai gatavs virsmas dezinfekcijas un tīrīšanas šķīdums neinvazīvām un neimersablām medicīnas ierīcēm saskaņā ar Direktīvu 93/42/EEK.

Biocīds:

Gatavs lietošanai virsmu dezinfekcijas un tīrīšanas šķīdums kā biocīds: vispārējām virsmām.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

750 ml pudelei:

Lietošanai gatavs risinājums.

Rūpīgi samitriniet virsmu, nodrošinot kontaktu ar visu virsmu, noslaukiet virsmu ar tīru drānu un ļaujiet nožūt. Vai arī uzklājiet līdzekli uz tīras drāniņas, noslaukiet virsmu un atstājiet nožūt. Ievērojiet norādīto kontakta laiku un nosacījumus, lai nodrošinātu nepieciešamo efektivitāti. Nelietot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidētajiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa.

Medicīnas ierīcēm:

Nav nepieciešama skalošana, izņemot vietas, kas saskaras ar ādu vai gļotādu. Ievērojiet ražotāja norādījumus par medicīnisko ierīču tīrīšanu un dezinfekciju.

SATURS

100 g satur šādas aktīvās sastāvdaļas: 2,0 g ūdeņraža peroksīda (CAS 7722-84-1), 0,5 g fēnoksietānola (CAS 122-99-6).

GLABĀŠANA

Neglabāt izstrādājumu oriģinālajā iepakojumā augstāk par 25 °C. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem. Derīguma termiņš pēc atvēršanas: Līdz derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.



TIKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI.

Incidin™ OxyWipe NG

LIETOŠANAI GATAVAS VIRSMAS DEZINFEKCIJAS UN TĪRĪŠANAS SALVETES

EFEKTĪVS

- Plašs darbības spektrs un īss iedarbības laiks - apvienojumā ar tīrīšanas veiktspēju

DROŠS

- Lieliska materiālu saderība, plaša materiālu saderība, tostarp jutīgām virsmām, piemēram, ABS, PMMA-Plexiglas.

LIETOTĀJAM DRAUDZĪGS

- Tīrīt un dezinficēt vienā solī

ĪPAŠĪBAS

- Augstas kvalitātes polipropilēna audums (50 g/m²) efektīvai lietošanai 20x20 cm

MIKROBIOLOĢISKĀ EFEKTIVITĀTE BIOCĪDU UN MEDICĪNAS PRODUKTU LIETOŠANA

EFEKTIVITĀTE	EFEKTĪVAIS LAIKS
Virsmu dezinfekcija saskaņā ar VAH procedūru 2015 (augsta slodze)	
Baktericīds, levurocīds	1 min
EN 16615* (baktericīds, levrocīds)	1 min
EN 16615* (fungicīds)	5 minūtes
EN 16615* (tuberkulocīds/mikobaktericīds)	15 minūtes
EN 13727* (baktericīds)	1 min
LV 13624* (levrocīds)	2 min
EN 13624* (fungicīds)	15 minūtes
EN 14348* (tuberkulocīds/mikobaktericīds)	30 minūtes
EN 14476* (ierobežota viruicīda iedarbība)	5 minūtes
EN 14476** (ierobežota viruicīda iedarbība PLUS)	30 minūtes
LV 14476** Adenovīruss	30 minūtes
LV 14476*/** Norovīruss (MNV)	30 minūtes
LV 14476* Poliomavīruss SV 40	5 minūtes
LV 14476* Rotavīruss	5 minūtes
Ierobežota viruicīda iedarbība (ieskaitot HIV, HBV, HCV) saskaņā ar RKI ieteikumu 2022***	30 sek.

* augsta slodze ** zema slodze *** DVV 2015 Pieskares tests

UZMANĪGI LIETOT BIOCĪDUS UN MEDICĪNAS PRODUKTUS.

PIRMS LIETOŠANAS VIENMĒR IZLASIET ETIĶETI UN INFORMĀCIJU PAR PRODUKTU.
TIKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI.

PIEMĒROŠANAS JOMA



Medicīniskās ierīces:

Lietošanai gatavs virsmas dezinfekcijas un tīrīšanas salvetes neinvazīvām un neimersablām medicīnas ierīcēm saskaņā ar Direktīvu 93/42/EEK.

Biocīds:

Gatavs lietošanai virsmas dezinfekcijas un tīrīšanas salvetes kā biocīds: vispārējām virsmām.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietošanai gatava salvette.

Paņemiet tīrīšanas drānu. Rūpīgi noslaukiet virsmu, nodrošinot kontaktu ar visu virsmu, un atstāiet nožūt. Lūdzu, ņemiet vērā noteikto kontakta laiku un nepieciešamās efektivitātes nosacījumus. Pēc lietošanas aizveriet iepakojuma vāku. Nelietot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidētājiem, piemēram, marmors, varš vai misiņš.

Medicīniskā ierīce:

Skalošana ir nepieciešama tikai tad, ja apstrādājamās vietas saskaras ar gļotādām.

Ievērojiet ražotāja norādījumus par medicīnisko ierīču tīrīšanu un dezinfekciju.

SATURS

Impregnējošais šķīdums: 100 g satur šādas aktīvās sastāvdaļas: 2,0 g ūdeņraža peroksīda (CAS 7722-84-1), 0,5 g fenoksietanola (CAS 122-99-6).

GLABĀŠANA

Neglabāt izstrādājumu oriģinālajā iepakojumā ne augstāk par 25 °C. Uzglabāt vēsā, sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem.

Derīguma termiņš pēc atvēršanas: 3 mēneši



Incidin™ OxyFoam NG

PASŪTĪJUMA INFORMĀCIJA

PRODUKTS	IESPAKOJUMA VIENĪBA	PANTA NUMURS
Incidin™ OxyFoam NG	6 x 750 ml	3113950
Incidin™ OxyFoam NG	2 x 5L	3114050

Incidin™ OxyWipe NG

PASŪTĪJUMA INFORMĀCIJA

PRODUKTS	IESPAKOJUMA VIENĪBA	PANTA NUMURS
Incidin™ OxyWipe NG	6 x 100 salvetes (20 x 20 cm)	3114110
Incidin™ OxyWipe NG XL	6 x 50 salvetes (25 x 37 cm)	3114190
Flowpack sienas turētājs no plastmasas polipropilēna (PP)	12 x 1	100 576 86